

6. CHAPITRE 6 : AUTRES RAVAGEURS

6.1. Ravageurs vertébrés

- ★ Règne : ANIMAL
- ★ Embranchement : VERTEBRES
 - Squelette interne
 - Symétrie bilatérale
 - Système nerveux dorsal
 - 1 seule cavité générale
- ★ 2 classe importantes de ravageurs:
 - C/ OISEAUX
 - C/MAMMIFERES

6.1.1. C/ Oiseaux

6.1.1.1. Définition

- Ils sont aériens : possèdent des ailes et des plumes
- Ils sont homéothermes¹
- Ils possèdent un bec

6.1.1.2. Dégâts

- Prélèvement de semences (semées ou de réserves)
- Attaque de fruits charnus (cerises, pêches, abricots...)
- Attaque des bourgeons (Bouvreuil)
- Dégâts indirects : fientes

6.1.1.3. 3 ordres principaux (pour les ravageurs)

- ★ O/ COLOMBIFORMES ou COLOMBINS
 - Ailes bien développées
 - Bec court, mou et renflé à la base

Ex : Pigeon ramier, Palombe : *Columba palumbus*

- ★ O/ GALLIFORMES ou GALLINACEES
 - Ailes bien développées
 - Bec fort
 - Pattes assez robustes
 - Ailes courtes

Ex : Faisan : *Phasianus colchicus*

¹ Homéothermes : Température constante

★ O/ PASSEIFORMES ou PASSEREAU

- Petite taille en général
- Très bon en vol

➤ F/ CORVIDES

Ex :

- Corbeau freux : *Corvus frugilegus* (noir, dessus du bec déplumé, cri caractéristique)
- Corneille noir : *Corvus corone* (bec plumé)

➤ F/ STURNIDES

Ex : Etourneau, sansonnet : *Sturnus vulgaris* (Petit, vols groupés)

➤ F/ PASSEIDES

Ex :

- Moineau domestique : *Passer domesticus*
- Bouvreuil, chardonnet (→ gros bec)
- Mésange (→ bec fin)

6.1.2. C/ MAMMIFERES

6.1.2.1. Définition

- Développement vivipare
- Corps avec poil totalement ou partiellement
- Présence des mamelles
- Température constante

6.1.2.2. O/ ONGULES ou ARCTIODACTYLES

★ F/ CERVIDES

Ex : Cerf : *Cervus elaphus* → Broute de colza, mange les bourgeons et les écorces d'arbres

★ F/ CAPRIDES

Ex : Chevreuil européen : *Capreolus capreolus* → Broute, mange les fruits

★ F/ SUIDES

Ex : Sanglier : *Sus scrofa* → labour, déterre, mange

6.1.2.3. O/ INSECTIVORES

★ F/ TALPIDES

Ex : Taupe : *Talpa europea* → mange les racines, creuse des galeries

6.1.2.4. O/ LAGOMORPHES

★ F/ LEPORIDES

Ex :









- Lièvre : *Lepus europaeus*
- Lapin de garenne : *Oryctolagus cuniculus* (oreilles courtes)









6.1.2.5. O/ RONGEURS






- ★ Rongeurs champêtres
 - Campagnol des champs : *Microtus arvalis* (gris beige avec ventre clair)
 - Mulot : *Apodemus sylvaticus*
 - Léroty : *Eliomys quercinus* (queue touffue)

- ★ Rongeurs aquatiques
 - Rat musqué : *Ondatra zibethicus*
 - Ragondin : *Myocastor coypus*

- ★ Rongeurs commensaux
 - Souris gris : *Mus musculus* (F/ Mussidés)
 - Rat d'égout ou surmulot ou rat de gris : *Ratus norvegicus* (F/ Mussidés)
 - Rat des greniers : *Ratus ratus*

CLASSE	ORDRE	FAMILLE	Nom	Photo
C/ Oiseaux	O/ Colombiformes ou Colombins		Pigeon ramier, Palombe (<i>Columba palumbus</i>)	
	O/ Galliformes ou Gallinacées		Faisan (<i>Phasianus colchicus</i>)	
	O/ Passéiforme ou Passereau	F/ Corvidés	Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	
			Corneille noir (<i>Corvus corone</i>)	
		F/ Sturnidés	Etourneau, sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	
		F/ Passéidés	Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	
			Bouvreuil, chardonnet	
			Mésange	

C/ Mammifères	O/ Ongulés ou Arctiodactyles	F/ Cervidés	Cerf (<i>Cervus elaphus</i>)	
		F/ Capridés	Chevreuril européen (<i>Capreolus capreolus</i>)	
		F/ Suidés	Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	
	O/ Insectivores	F/ Talpidés	Taupe (<i>Talpa europaea</i>)	
	O/ Lagomorphes	F/ Léporidés	Lièvre (<i>Lepus europaeus</i>)	
			Lapin de garenne (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	
	O/ Rongeurs	Rongeurs Champêtres	Campagnol des champs (<i>Microtus arvalis</i>)	
			Mulot (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	

			Lérot (<i>Eliomys quercinus</i>)	
	Rongeurs aquatiques		Rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>)	
			Ragondin (<i>Myocastor coypus</i>)	
	Rongeurs commensaux F/ Mussidés		Souris gris (<i>Mus musculus</i>)	
			Rat d'égout ou surmulot ou rat gris (<i>Ratus norvegicus</i>)	
			Rat des greniers (<i>Ratus ratus</i>)	